GRANDES CULTURES

SRPV NORD PAS-DE-CALAIS

Bulletin N° 18 du 18 octobre 1994

CEREALES

- * Stade : Les premières parcelles semées sont en cours de levée
- Pucerons vecteurs: L'activité de vol est intense depuis le début du mois, mais est stoppée depuis 2 jours par les températures froides.

Comparaison avec les années antérieures

Captures de pucerons au piège à succion de Loos-en-Gohelle

Année	89	90	91	92	93	94
1ère décade Octobre	52	20	331	3093	287	2572
Pème décade Octobre	70	214	371	240	177	2343

^{* 2}eme décade d'Octobre 94 en cours

CEREALES

Début levée

Pucerons vecteurs de la jaunisse

Vol intense depuis début octobre

Mouche grise:

Résultats régionaux

MAIS

Charbon commun:

Nombreux cas

ENDIVE

Mouche de l'endive

Réunion SRPV - FREDEC Mercredi 16 novembre 1994

Captures des derniers jours

		00	CTOBE	RE		
10	11	12	13	14	15	16
130	67	1004	116	136	971	49

© Conséquences:

Toute parcelle levée avant le 15 octobre a été soumise à une forte pression de colonisation par les pucerons.

Ces parcelles doivent être contrôlées et une intervention insecticide déclenchée dès le stade 1 feuille, si 5 à 10 % des pieds sont colonisés





PARCELLES TOUTES EN BETTERAVES EN 1994

Région	Localité	Nbre d'oeufs viables par Ha (en millions)	Risque	
	Souchez	1,30	Moyen	
	Neuville St Vaast	1,93	Moyen	
ARRAS - OUEST	Anzin St Aubin 1	1,63	Moyen	
	Anzin St Aubin 2	5,50	Très élevé	
	Duisans	1,00	Faible	
	Monchy le Preux	3,63	Elevé	
	Cherisy	2,15	Moyen	
ARRAS - EST	Vis en Artois 1	6,90	Très élevé	
	Vis en Artois 2	3,85	Elevé	
	Loos-en-Gohelle	2,60	Elevé	
LENS - OUEST	Ragougneux	1,35	Moyen	
BETHUNE	Mazingarbe 1	0,73	Faible	
	Mazingarbe 2	2,48	Moyen	
LENS - EST	La Gueule d'Ours	1,30	Moyen	
DOUAI	Willerval	0,55	Faible	
	Neuvireuil	0,23	Faible	
	Hamblain les Près	0,70	Faible	
To Market	Oisy le Verger 1	6,98	Très élevé	
CAMBRAI - OUEST	Oisy le Verger 2	1,40	Moyen	
MARQUION	Epinoy	2,40	Moyen	
	Saudémont	5,60	Très élevé	

PARCELLES EN JACHERE EN 1994

Jachère	Localité	Nbre d'oeufs viables par Ha (en millions)	Risque
Faunistique	Maroeuil	0	Nul
Phacélie	Vis-en-Artois	0,15	Faible
Navette	Loos-en-Gohelle	0,025	Faible
Moutarde	Bailleul-Sire- Berthould	0	Nul
Raygrass + Trèfle Perse	Oisy le Verger	0,15	Faible
Trèfle incarnat	Ecuires	0	Nul

Aucune parcelle en jachère n'est favorable à la mouche grise

Endive

Le vol de la mouche est toujours très faible dans le Nord-Pas-de-Calais. Toutefois, le poste de Roye (80) indique des captures plus conséquentes depuis le 5 octobre.

Dans ce secteur une intervention chimique se justifie (seuil de 30 mouches atteint le 7 octobre).

Nombre de mouches capturées du 1/09 au 14/10

Réseau Piégeage SRPV - FNPE	1990	1991	1992	1993	1994
Graincourt	451	679	44	7	6
Loos-en-Gohelle	87	59	49	500	10
Tilques	Mise du	en poste	place en 1993	13	1
Looberghe	Mise du	en poste	place en 1993	142	16
Roye(80)	Mise place	en en 1992	13	296	66

Le tableau ci contre donne pour quelques postes, le nombre total de mouches capturées du 1er septembre au 14 octobre de 1990 à 1994. Ces données confirment que 1994 est une année à faibles captures. Il semblerait que les fortes températures enregistrées en juillet aient été défavorables à la 2ème génération. Des observations en parcelle réalisées a Loos - en-Gohelle confirment l'absence de mines dans les feuilles d'endive

REUNIONS SRPV - FREDEC

Plusieurs réunions destinées à nos abonnés et collaborateurs sont prévues.

* Les réunions "bilan" de nos études et expérimentations auront lieu :

MERCREDI 16 NOVEMBRE - LOOS-EN-GOHELLE

9 h - 12 h 30 Grandes cultures - Salle Omer Caron

15 h - 18 h Légumes - Salle de réunion du Service Régional de la Protection des Végétaux.

Un repas pourra être pris sur inscription.

* Une réunion bilan débat dans la seconde quinzaine de janvier sur les travaux portant sur la Lutte biologique, Lutte intégrée, Protection de l'environnement...

AUTRES PRECEDENTS EN 1994

Précédent	Localité	Nbre d'oeufs viables par Ha (en millions)	Risque	
Endive	Oisy le Verger	0,18	Faible	
Pois	1 1223	0,2	Faible	
Haricot		0	Nul	
Pomme de terre	"	0,05	Faible	
Haricot	Vis-en-Artois	0,05	Faible	
Lin	1 2 40	0,25	Faible	
Pomme de terre	1	0	Nul	
Endive	n n	4,48	Elevé	

Les prélèvements dans différents précédents ont été pratiqués pour 2 secteurs géographiques où le niveau des pontes s'est révélé élevé en 94.

Seule une parcelle d'endive est très concernée par la mouche, ce qui confirme que le précédent endive est un précédent à risque au même titre que la betterave.

Echelle de risque

Moins de 1,25 millions oeuf/ha : Risque faible à nul Entre 1,25 et 2,5 millions oeuf/ha : Risque moyen Entre 2,5 et 5 millions oeufs/ha : Risque élevé Au dessus de 5 millions oeufs/ha : Risque très élevé

MAIS

** Charbon commun (Ustilago maidis)

De nombreux cas de charbon commun sont enregistrés cette année sur maïs.

Les symptômes sont spectaculaires : larges excroissances blanchâtres de 1 à 15 cm de long dans les épis, ces excroissant prennent l'aspect de tumeurs remplies de poudre noirâtre. Il y a également des symptômes sur tiges et sur feuilles.

Les spores se conservent des années dans le sol et peuvent être emportées au loin par le vent.

Les attaques sont particulièrement importantes lors des étés secs (comme en 1976 ou cette année).

Il n'y a pas de méthodes de lutte, mais des sensibilités variétales différentes.

D'après l'EDE 62, il n'y a pas risque de toxicité pour le bétail, mais diminution de l'appétence de l'ensilage.

Aussi, en cas de fortes attaques, il vaut mieux essayer de mélanger des lots plus ou moins attaqués, pour répartir dans la masse les plantes charbonnées.